

Резолюція про застосування фіксованої комбінації антигіпертензивної терапії з блокатором рецепторів ангіотензину2, блокатором кальцієвих каналів, тіазідовим діуретиком вітчизняного виробництва при лікуванні підвищеного рівня артеріального тиску

Фіксовані подвійна і потрійна комбінації валсартану, амлодипіну і гідрохлортіазиду є потужними антигіпертензивними комбінованими препаратами для лікування артеріальної гіпертензії з коморбідними станами з міжнародною доказовою базою [1,2,3].

Рада Експертів загальної практики-сімейної медицини і внутрішніх хвороб рекомендує дотримуватися міжнародних принципів цільового рівня артеріального тиску при лікуванні артеріальної гіпертензії і, якщо на попередньому етапі лікування пацієнту із підвищеним рівнем артеріального тиску не було призначено фіксованої комбінованої терапії, та у пацієнта немає протипоказань для їх призначень, лікарі загальної практики - сімейної медицини і терапевти можуть самостійно ініціювати призначення вітчизняної фіксованої подвійної або потрійної комбінації валсартану, амлодипіну і гідрохлортіазиду (в Україні виробляється вітчизняний препарат Тіара дуо, Тіара Тріо), враховуючи високу ефективність і рівень безпеки, простоту застосування, зручність прийому для пацієнта, що сприяє покращенню якості життя пацієнтів та зниженню ризиків ускладнень.

Література

1. Уніфікований клінічний протокол первинної та спеціалізованої медичної допомоги «Гіпертонічна хвороба (артеріальна гіпертензія)» МОЗ України 12.09.2024.
2. Giuseppe Mancia , Reinhold Kreutz , Mattias Brunström et al. 2023 ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. J. Hypertens 2023, 41 (12), p.1874-2071
3. Margus Viigimaa, Charalambos Vlachopoulos, Michael Doulas et al/ ESH Working group on sexual dysfunction, Update of the position paper on arterial hypertension and erectile dysfunction. J. Hypertens, 2020, 38,7, p.1220-1234.