

Резолюція про застосування інгібіторів НЗКТГ2 лікарями первинної практики – сімейними лікарями для лікування цукрового діабету 2 типу.

Обов'язкові заходи. Проводити діагностику та лікування хворих на ЦД у відповідності до Уніфікованого клінічного протоколу первинної та спеціалізованої медичної допомоги «Цукровий діабет 2 типу у дорослих», затверджений МОЗ України 24.07.2024.

Особливості гіпоглікемічної терапії при ЦД 2 типу у осіб з ССЗ:

Пацієнтам з ЦД2, які мають АСССЗ або встановлену хворобу нирок, рекомендований іНЗКТГ2.

Пацієнтам з ЦД2 та встановленим АСССЗ, множинними факторами ризику АСССЗ або діабетичним захворюванням нирок рекомендується інгібітор НЗКТГ2. У пацієнтів з ЦД2 та встановленим АСССЗ або кількома факторами ризику АСССЗ - комбінована терапія іНЗКТГ2 та арГПП1.

Пацієнтам з ЦД2 та встановленою СН зі збереженою або зниженою фракцією викиду рекомендується іНЗКТГ2.

Пацієнтам з ЦД2 та встановленою СН зі збереженою або зниженою фракцією викиду рекомендується іНЗКТГ2

Основною метою лікування хворих на ЦД 2 типу є досягнення еуглікемічного стану та попередження розвитку ускладнень.

Якщо на попередньому етапі пацієнту із діагнозом ЦД 2 типу не було призначено іНЗКТГ-2 (емпагліфлозин та інші), лікарі загальної практики сімейної медицини, терапевти можуть самостійно ініціювати їх призначення, враховуючи високий рівень безпеки, простоту застосування і сумісність з іншими препаратами.

Рада Експертів загальної практики та сімейної медицини рекомендує дотримуватися цих принципів лікування для поліпшення якості життя пацієнтів та зниження ризику розвитку ускладнень ЦД.

Література

1. Уніфікований клінічний протокол первинної та спеціалізованої медичної допомоги цукровий діабет 2 типу у дорослих, МОЗ України від 24.07.2024 року.
2. Xu B, Li S., Kang B. et al. The current role of sodium-glucose cotransporter 2 inhibitors in type 2 diabetes mellitus management. *Cardiovascular Diabetology*, 2022,21,83, doi.org/ 10.1186/s 12933-022-01512-w